



AJUSTES DE LA LISTA DE PROHIBICIONES 2022

GLUCOCORTICOIDES S9 VÍAS DE USO | 1 DE ENERO 2022



A partir del 1 de enero del año 2022, el uso de glucocorticoides, en competición, (Grupo S9. de la lista de sustancias y métodos prohibidos de la WADA) estará prohibido cuando sean administrados por vía oral, vía rectal o por cualquier vía inyectable.



Este cambio supone que se considerarán PROHIBIDAS todas las vías inyectables de administración. Estas vías incluyen: intravenosa, intramuscular, periarticular, intraarticular, peritendinosa, intratendinosa, epidural, intratecal, intrabursal, intralesional (p.e. intraqueloidea), intradérmica y subcutánea.

Las vías de administración oral incluyen: mucosa oral, bucal, gingival y sublingual. La vía del canal dentario no está prohibida.



Otras vías de administración (incluyendo la tópica: inhalada, intranasal, oftalmológica, perianal y dérmica), no están prohibidas cuando se usan según las dosis e indicaciones terapéuticas indicadas por el fabricante.

Si eres un jugador activo, deberás pedir una Autorización de Uso Terapéutico en caso de requerir su uso, en cualquier caso, como siempre, hay que declarar cualquier medicación al pasar por un control antidopaje, y conservar la documentación.



La administración de glucocorticoides en condiciones de “fuera de competición” por las vías inyectables, según el glucocorticoide administrado y dosis, pueden dar lugar a concentraciones urinarias del mismo y/o sus metabolitos que provocaran un resultado analítico adverso en un control de dopaje, por ello su administración fuera de la competición tiene que tener en cuenta los diferentes periodos de lavado post administración. Para reducir este riesgo, acorde a la información facilitada por AMA se deben considerar los periodos mínimos de lavado comenzando en el momento de la administración y terminando con el inicio del periodo llamado “en competición” (comienza a las 23:59 horas del día anterior a una competición en la que un deportista tiene programada su participación, salvo que la AMA establezca un periodo diferente para un deporte en concreto.

SOLICITUD DE USO TERAPÉUTICO

La administración de inyecciones locales de glucocorticoides debe tener en cuenta que la vía periarticular o intraarticular puede, a veces, conducir a una administración intramuscular. Si se sospechase que se ha producido una administración intramuscular deberán tenerse en consideración los periodos de lavado relativos a esta vía, o solicitar una Autorización de Uso Terapéutico.

En la Tabla adjunta se muestran, a modo de referencia, los periodos de lavado relativos al uso de glucocorticoides y que se fundamentan en la administración de acuerdo a las dosis máximas indicadas por el fabricante.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN	GLUCOCORTICOIDE	PERIODO DE LAVADO*
Oral**	Todos los glucocorticoides	3 días
	Excepto: acetónido de triamcinolona	30 días
Intramuscular	Betametasona, dexametasona, metilprednisolona	5 días
	Prednisolona, prednisona	10 días
	Acetónido de triamcinolona	60 días
Inyecciones locales (incluyendo periarticular, intraarticular, peritendinosa e intratendinosa)	Todos los glucocorticoides	3 días
	Excepto: acetónido de triamcinolona, prednisolona, prednisona	10 días



*Periodo de lavado: se refiere al tiempo transcurrido entre la administración de la última dosis y el inicio del periodo en competición (que comienza a las 23:59 horas del día anterior a una competición en la que un deportista tiene programada su participación, salvo que la AMA establezca un periodo diferente para un deporte en concreto). Esto es para permitir la eliminación del glucocorticoide hasta niveles inferiores a los del nivel de información de su detección.

**Las vías de administración oral incluyen: mucosa oral, bucal, gingival y sublingual. La vía del canal dentario no está prohibida.



Cualquier deportista, incluido en algún Grupo de Seguimiento Individualizado, deberá solicitar, en su caso, una Autorización de Uso Terapéutico. Aunque alguno de tus deportistas no perteneciese a ningún Grupo de Seguimiento, en caso de pasar un control anti dopaje podría necesitar solicitar una Autorización de Uso Terapéutico con carácter retroactivo, por ello aparte de declarar cualquier medicación al pasar el control antidopaje, se debe conservar la documentación necesaria para poder solicitar la Autorización de Uso Terapéutico



S3. AGONISTAS BETA-2 B2. CON RESPECTO AL SALBUTAMOL

"Los intervalos de tiempo de dosificación diaria se modifican a 600 microgramos durante ocho horas a partir del momento en que se toma cualquier dosis (anteriormente 800 microgramos a lo largo de 12 horas). Esto es para reducir el riesgo de que surja un potencial RAA despues de tomar altas dosis de una vez. La dosis diaria total permitida se mantiene en 1.600 microgramos cada 24 horas. Se debe solicitar una AUT para dosis que superen estos límites".

SI TIENE DUDAS, **CONTACTE CON LA UNIDAD ANTIDOPAJE DE LA CONMEBOL.**



COMISIÓN MÉDICA
& UNIDAD ANTIDOPAJE

www.conmebol.com
unidad.antidopaje@conmebol.com